

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA COREA DE LA HD

ONCE-DAILY
Austedo XR®
(deutetrabenazine)
extended-release
6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg, 30 mg,
36 mg, 42 mg, and 48 mg tablets

Para el tratamiento de la **corea de la enfermedad de Huntington (HD) en adultos**

Reduzca los movimientos de la corea de la HD con AUSTEDO XR® de dosis diaria



El tratamiento recetado número 1 para la corea de la HD*

*Período de tiempo 05/2022 hasta 10/2025.

USOS APROBADOS

Los comprimidos de liberación prolongada AUSTEDO XR® (deutetrabenazine) y los comprimidos de AUSTEDO® (deutetrabenazine) son medicamentos recetados que se usan para tratar:

- los movimientos involuntarios (corea) de la enfermedad de Huntington. AUSTEDO XR y AUSTEDO no curan la causa de los movimientos involuntarios y no trata otros síntomas de la enfermedad de Huntington, como los problemas para pensar o los emocionales.
- movimientos en el rostro, la lengua u otras partes del cuerpo que no se pueden controlar (discinesia tardía).

No se conoce la seguridad y efectividad de AUSTEDO XR y AUSTEDO en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AUSTEDO XR® y AUSTEDO® pueden causar efectos secundarios serios en personas con la enfermedad de Huntington, como depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas.

No comience a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO si tiene depresión (depresión no tratada o depresión que no está bien controlada por la medicina) o si tiene pensamientos suicidas. Preste especial atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos en el estado de ánimo, en los pensamientos o en los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se comienza con AUSTEDO XR y AUSTEDO y cuando la dosis se cambia. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si se siente con depresión o tiene cambios inusuales del estado de ánimo o del comportamiento, o si tiene pensamientos suicidas.

Lea la **Información importante de seguridad** en las páginas 8 y 9 y haga clic [aquí](#) o visite www.AUSTEDO.com para leer o imprimir la **Guía del medicamento** para AUSTEDO XR.

teva

¿Qué es la corea de la enfermedad de Huntington (HD)?

SÍNTOMAS Y CAUSAS DE LA COREA DE LA HD

La HD es un trastorno cerebral genético que provoca un aumento anormal de la liberación de dopamina. La dopamina es un químico cerebral responsable del movimiento que, en grandes cantidades, puede causar corea. La corea es un síntoma de la HD que causa movimientos corporales incontrolables.

*La corea es uno de los síntomas más visibles de la HD y **se puede tratar***

La corea puede ser un peligro para las personas con HD y aquellas que las cuidan, ya que, impacta en la vida diaria y los vínculos. Los acompañantes informaron la corea como el síntoma más impactante de la HD.

Cómo se ven los signos de la corea de la HD:



Chasqueo de dedos



Agitación de brazos o piernas



Encogerse de hombros



Muecas



Torsiones y sacudidas



Pestaño o movimiento de los ojos irregulares

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

No tome AUSTEDO XR o AUSTEDO si:

- tiene la enfermedad de Huntington, depresión o pensamientos suicidas.
- tiene problemas hepáticos.
- está tomando reserpina. **No** tome medicamentos que contengan reserpina con AUSTEDO XR o AUSTEDO. Si su proveedor de atención médica planea cambiar su medicación de reserpina a AUSTEDO XR o AUSTEDO, debe esperar al menos 20 días posteriores a su última dosis de reserpina antes de comenzar a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO.

EL IMPACTO DE LA COREA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (HD)

Los movimientos de la corea de la HD pueden:



Dificultar el caminar o subir escaleras



Hacer que vestirse sea desafiante



Afectar su capacidad de cepillarse los dientes o bañarse



Afectar su capacidad de comer o masticar



Dificultar el habla



Las personas con corea no pueden evitar estos movimientos por sus propios medios y pueden empeorar con el estrés. Con el tiempo, estos movimientos causan la pérdida de la independencia.

Obtenga más información sobre los beneficios del tratamiento con los comprimidos de liberación prolongada de AUSTEDO XR® (deutetrabenazine)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

No tome AUSTEDO XR o AUSTEDO si:

- está tomando un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO). **No** tome un IMAO dentro de los 14 días posteriores a dejar de tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO. **No** comience a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO si dejó de tomar un IMAO en los últimos 14 días. Si no está seguro, consulte con su proveedor de atención médica.

Acerca del tratamiento

BENEFICIOS DE LOS COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE AUSTEDO XR® (DEUTETRABENAZINE)



AUSTEDO XR reduce los movimientos de la corea de la HD con **un comprimido de liberación prolongada de dosis diaria**.*



Las personas que toman AUSTEDO XR informaron tener **más capacidad física** de realizar las tareas diarias.



Sus necesidades del tratamiento de la corea de la HD son exclusivas para usted, y AUSTEDO XR tiene **diferentes concentraciones** para que su proveedor de atención médica pueda encontrar la dosis que funciona para usted.



Escanee este código QR o visite www.AUSTEDO.com para ver los efectos secundarios comunes de AUSTEDO XR.

*AUSTEDO XR de una dosis diaria contiene los mismos activos que los comprimidos AUSTEDO® (deutetrabenazine) de dos dosis diarias. La información en esta página se basa en una dosificación de dos dosis diarias.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

No tome AUSTEDO XR o AUSTEDO si:

- está tomando tetrabenazina. Si su proveedor de atención médica planea cambiar su medicación de tetrabenazina a AUSTEDO XR o AUSTEDO, tome su primera dosis de AUSTEDO XR o AUSTEDO el día siguiente a su última dosis de tetrabenazina.
- está tomando valbenazina.

PUEDE SER POSIBLE TENER CONTROL SOBRE LA COREA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (HD)

>9^{DE} CADA 10 PERSONAS

que toman los comprimidos de acción prolongada AUSTEDO XR® (deutetrabenazine) manifestaron que mejoró su control del movimiento desde el inicio del tratamiento†

Las personas que toman AUSTEDO XR® vieron UNA REDUCCIÓN EN EL MOVIMIENTO EN TAN SOLO DOS SEMANAS

LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS

~3 AÑOS‡



Ray, una persona real con corea de la HD y Rhonda, una acompañante real de la corea de la HD.

100% de los pacientes con HD les pareció fácil tomar AUSTEDO XR†

†Resultados de una encuesta real que incluyó 31 pacientes con corea de la HD que toman AUSTEDO XR.

‡Este fue un estudio de etiqueta abierta, que es un ensayo del medicamento en el que todos los participantes están conscientes del medicamento que están probando.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*


Otros efectos secundarios posibles incluyen:

- **Ritmo cardíaco irregular (prolongación de QT).** AUSTEDO XR y AUSTEDO aumentan las probabilidades de sufrir ciertos cambios en la actividad eléctrica del corazón. Estos cambios pueden causar anomalías peligrosas en el ritmo cardíaco. Tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO con ciertos medicamentos puede aumentar esta probabilidad.

Cómo comenzar

DOSIFICACIÓN PERSONALIZADA PARA LA COREA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (HD)

Su proveedor de atención médica comenzará a recetarle una dosis baja de los comprimidos de liberación prolongada AUSTEDO XR® (deutetrabenazine) y la aumentará gradualmente la dosis con el tiempo. Este abordaje le permite a su cuerpo acostumbrarse al medicamento y puede ayudarlo a reducir los efectos secundarios, como los movimientos. De esta forma, su proveedor de atención médica puede encontrar una dosis que le funcione. Este proceso se llama titulación.



Los comprimidos son solo a modo ilustrativo, no representan el tamaño real o la similitud.

Obtener su dosis de mantenimiento

Una vez que llegue a una dosis que proporcione una reducción efectiva de los movimientos de la corea de la HD y que tolera, esa será su dosis de mantenimiento. Si desea aumentar su dosis, puede analizar otras opciones de dosificación con su proveedor de atención médica.



Como todas las personas son diferentes, su dosis de mantenimiento será la que funcione para usted



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

Otros efectos secundarios posibles incluyen:

- **Síndrome neuroléptico maligno.** Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente y acuda a la sala de emergencias más cercana si desarrolla los siguientes signos y síntomas y no tienen otro motivo evidente: fiebre alta, rigidez muscular, pensamientos negativos, ritmo cardíaco muy rápido o irregular o aumento de la sudoración.

CÓMO TOMAR SU MEDICAMENTO



Una vez
al día



Con agua



Entero
(no aplastar
o partir)



Con o sin
alimentos

Si no puede tragar los comprimidos AUSTEDO XR®/AUSTEDO® (deutetrabenazina) enteros, consulte con su proveedor de atención médica. Quizá necesite un medicamento diferente.

CÓMO INICIARÁ EL TRATAMIENTO



La imagen no es una imagen real del Kit de titulación gratuito.

Su proveedor de atención médica puede proporcionarle un kit de titulación GRATUITO a:

Llevar a casa
desde su oficina



Obténgala
en su farmacia*

El Kit de titulación lo guiará por su primer mes con AUSTEDO XR.

*Con un vóucher de prueba gratuita en AUSTEDOcardform.com

97%

de los pacientes con HD les pareció fácil
incluir AUSTEDO XR en su rutina diaria†

†Resultados de una encuesta real que incluyó 31 pacientes con corea de la HD que toman AUSTEDO XR.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

Otros efectos secundarios posibles incluyen:

- **Inquietud.** Puede sufrir una condición si siente un fuerte impulso por moverse. Este proceso se llama acatisia.
- **Parkinsonismo.** Los síntomas incluyen: temblores leves, rigidez muscular, dificultad para moverse, dificultad para mantener el equilibrio o caídas.

USOS APROBADOS

Los comprimidos de liberación prolongada AUSTEDO XR® (deutetrabenazine) y los comprimidos de AUSTEDO® (deutetrabenazine) son medicamentos recetados que se usan para tratar:

- los movimientos involuntarios (corea) de la enfermedad de Huntington. AUSTEDO XR y AUSTEDO no curan la causa de los movimientos involuntarios y no trata otros síntomas de la enfermedad de Huntington, como los problemas para pensar o los emocionales.
- movimientos en el rostro, la lengua u otras partes del cuerpo que no se pueden controlar (discinesia tardía).

No se conoce la seguridad y efectividad de AUSTEDO XR y AUSTEDO en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AUSTEDO XR® y AUSTEDO® pueden causar efectos secundarios serios en personas con la enfermedad de Huntington, como depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. No comience a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO si tiene depresión (depresión no tratada o depresión que no está bien controlada por la medicina) o si tiene pensamientos suicidas. Preste especial atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos en el estado de ánimo, en los pensamientos o en los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se comienza con AUSTEDO XR y AUSTEDO y cuando la dosis se cambia. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si se siente con depresión o tiene cambios inusuales del estado de ánimo o del comportamiento, o si tiene pensamientos suicidas.

No tome AUSTEDO XR o AUSTEDO si:

- tiene la enfermedad de Huntington, depresión o pensamientos suicidas.
- tiene problemas hepáticos.
- está tomando reserpina. **No** tome medicamentos que contengan reserpina con AUSTEDO XR o AUSTEDO. Si su proveedor de atención médica planea cambiar su medicación de reserpina a AUSTEDO XR o AUSTEDO, debe esperar al menos 20 días posteriores a su última dosis de reserpina antes de comenzar a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO.
- está tomando un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO). **No** tome un IMAO dentro de los 14 días posteriores a dejar de tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO. **No comience** a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO si dejó de tomar un IMAO en los últimos 14 días. Si no está seguro, consulte con su proveedor de atención médica.
- está tomando tetrabenazina. Si su proveedor de atención médica planea cambiar su medicación de tetrabenazina a AUSTEDO XR o AUSTEDO, tome su primera dosis de AUSTEDO XR o AUSTEDO el día siguiente a su última dosis de tetrabenazina.
- está tomando valbenazina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Otros efectos secundarios posibles incluyen:

- **Ritmo cardíaco irregular (prolongación de QT).** AUSTEDO XR y AUSTEDO aumentan las probabilidades de sufrir ciertos cambios en la actividad eléctrica del corazón. Estos cambios pueden causar anomalías peligrosas en el ritmo cardíaco. Tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO con ciertos medicamentos puede aumentar esta probabilidad.
- **Síndrome neuroléptico maligno.** Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente y acuda a la sala de emergencias más cercana si desarrolla los siguientes signos y síntomas y no tienen otro motivo evidente: fiebre alta, rigidez muscular, pensamientos negativos, ritmo cardíaco muy rápido o irregular o aumento de la sudoración.
- **Inquietud.** Puede sufrir una condición si siente un fuerte impulso por moverse. Este proceso se llama acatisia.
- **Parkinsonismo.** Los síntomas incluyen: temblores leves, rigidez muscular, dificultad para moverse, dificultad para mantener el equilibrio o caídas.

La somnolencia (sedación) es un efecto secundario común de AUSTEDO XR y AUSTEDO. Mientras esté tomando AUSTEDO XR o AUSTEDO, no conduzca ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo reacciona usted. Beber alcohol o consumir otros medicamentos que también causen somnolencia mientras tome AUSTEDO XR o AUSTEDO pueden aumentar cualquier somnolencia que causen AUSTEDO XR y AUSTEDO.

Los efectos secundarios más comunes de AUSTEDO en personas con la enfermedad de Huntington incluye somnolencia (sedación), diarrea, cansancio y boca seca.

Los efectos secundarios más comunes de AUSTEDO en personas con discinesia tardía incluyen inflamación de nariz y garganta (nasofaringitis) y problemas para dormir (insomnio).

Se espera que los efectos secundarios más comunes de AUSTEDO XR sean similares a los de AUSTEDO en personas con la enfermedad de Huntington o discinesia tardía.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de AUSTEDO XR o AUSTEDO. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Lo invitamos a informar los efectos secundarios de medicamentos recetados a la FDA. Ingrese a www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Lea la **Guía de la medicación** adjunta **aquí**.

ES SENCILLO INSCRIBIRSE EN TEVA TOTAL SUPPORT™

Desde la verificación de beneficios y las opciones de asistencia financiera hasta la disponibilidad de enfermeras para ayudarlo, ofrecemos asistencia a las personas con corea HD y a sus cuidadores en cualquier momento del proceso de tratamiento.



**Inicie
el tratamiento**

**Ahorro y asistencia
financiera**

**Continuar con
el tratamiento**

INICIE EL TRATAMIENTO

Ayuda para navegar la cobertura del seguro

Ya sea que usted tenga Medicare, un seguro privado o no ningún seguro, Teva **Total Support** verificará la cobertura y analizará sus opciones de asistencia financiera con usted para ayudarlo a que su tratamiento sea asequible.



**El 89% de las personas que toman AUSTEDO XR®
obtienen la aprobación para la cobertura del seguro.**

Asistencia personalizada de farmacia especializada

Teva **Total Support** puede ayudarlo a ponerse en contacto con una farmacia que cumplirá con su receta de AUSTEDO XR y proporcionará asistencia continua luego de comenzar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)*

La somnolencia (sedación) es un efecto secundario común de AUSTEDO XR y AUSTEDO. Mientras esté tomando AUSTEDO XR o AUSTEDO, no conduzca ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo reacciona usted. Beber alcohol o consumir otros medicamentos que también causen somnolencia mientras tome AUSTEDO XR o AUSTEDO pueden aumentar cualquier somnolencia que causen AUSTEDO XR y AUSTEDO.

Lea la **Información importante de seguridad** en las páginas 8 y 9 y haga clic [aquí](#) o visite www.AUSTEDO.com para leer o imprimir la **Guía del medicamento** para AUSTEDO XR.

teva

ONCE-DAILY
Austedo XR®
(deutetrabenazina)
extended-release
6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg, 36 mg,
36 mg, 42 mg, and 48 mg tablets

Teva Total Support™

AHORRO Y ASISTENCIA FINANCIERA

Asistencia financiera para comenzar y continuar en tratamiento

Los pacientes nuevos pueden comenzar los **primeros 30 días gratis** con un **vóucher de prueba gratuita**.*

Los pacientes elegibles abonan ni más ni menos que **\$0 por mes** de gastos directos para renovar recetas con la **tarjeta de copago de AUSTEDO XR®**.†

Medicare ofrece programas adicionales para ayudar a que el tratamiento sea más asequible.

CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO

Apoyo de enfermería

Póngase en contacto con una enfermera dedicada a brindarle apoyo personalizado durante todo su tratamiento. Puede esperar:

- **Llamadas** de seguimiento para realizar comprobaciones y establecer objetivos
- **Información** sobre su diagnóstico y receta médica
- **Ayuda** para continuar con el tratamiento
- **Herramientas y recursos** para ayudarlo a seguir



Hay recursos adicionales disponible cuando se inscriba

Inscríbese en Teva Total Support

teva Total Support



1-800-887-8100

L a V, 9AM a 8PM ET

O ingrese a **[TevaTotalSupportHD.com](https://www.TevaTotalSupportHD.com)**

*El vóucher de prueba gratuita de 30 días solo está disponible para pacientes nuevos. El vóucher es bueno para hasta 4 semanas de titulación o 30 días de medicación.

†La oferta está disponible solo para pacientes con un seguro comercial. Esta oferta NO está disponible para pacientes de Medicare, Medicaid o cualquier otra forma de cobertura de seguros pública. Los gastos directos pueden variar. Aplican exclusiones y limitaciones. Véanse los términos y condiciones en **[AUSTEDOcardform.com](https://www.AUSTEDOcardform.com)**.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Los efectos secundarios más comunes de AUSTEDO en personas con la enfermedad de Huntington incluye somnolencia (sedación), diarrea, cansancio y boca seca.

Los efectos secundarios más comunes de AUSTEDO en personas con discinesia tardía incluyen inflamación de nariz y garganta (nasofaringitis) y problemas para dormir (insomnio).

Lea la **Información importante de seguridad** en las páginas 8 y 9 y haga clic **[aquí](#)** o visite **www.AUSTEDO.com** para leer o imprimir la **Guía del medicamento** para AUSTEDO XR.

teva

ONCE-DAILY
Austedo XR®
(deutetrabenazina)
extended-release
6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg, 36 mg,
36 mg, 42 mg, and 48 mg tablets

INICIAR EL TRATAMIENTO PARA REDUCIR LA COREA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTIGTON (HD)

- Más del doble de la reducción del movimiento en 12 semanas vs. el placebo*†
- Comprimido de liberación prolongada de dosis diaria
- Se puede tomar con otros medicamentos
- Iniciar sin costo
- **Inscríbase en Teva Total Support para obtener beneficios en el tratamiento**



Escanee este código
para acceder a otros recursos.

*AUSTEDO XR® de una dosis diaria contiene los mismos activos que los comprimidos AUSTEDO® (deutetrabenazine) de dos dosis diarias. La información en esta página se basa en una dosificación de dos dosis diaria.

†Mejora de 4.4 en personas que tomaron AUSTEDO vs. 1.9 en personas que tomaron placebo, con base en el puntaje de corea máxima total (TMC). El puntaje TMC se usa para medir los movimientos de corea de la enfermedad de Huntington (HD) en el rostro, la boca, el torso, los brazos y las piernas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AUSTEDO XR® y AUSTEDO® pueden causar efectos secundarios serios en personas con la enfermedad de Huntington, como depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. No comience a tomar AUSTEDO XR o AUSTEDO si tiene depresión (depresión no tratada o depresión que no está bien controlada por la medicina) o si tiene pensamientos suicidas. Preste especial atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos en el estado de ánimo, en los pensamientos o en los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se comienza con AUSTEDO XR y AUSTEDO y cuando la dosis se cambia. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si se siente con depresión o tiene cambios inusuales del estado de ánimo o del comportamiento, o si tiene pensamientos suicidas.

Lea la **Información importante de seguridad** en las páginas 8 y 9 y haga clic [aquí](#) o visite www.AUSTEDO.com para leer o imprimir la **Guía del medicamento** para AUSTEDO XR.